
# ERUPÇÃO ECTÓPICA DE INCISIVOS LATERAIS SUPERIORES INDUZIDA PELA PRESENÇA DE MESIODENS NA DENTADURA MISTA




**Kaiser TF[1], Paccini JVC[2]**

thaynarakaiser21@outlook.com

**[1]Especializando em Ortodontia pela Faculdade Sete Lagoas (FACSETE); [2] Mestre em Ortodontia pela Unicid - SP, em 2017.**


## INTRODUÇÃO

A hiperdontia corresponde à presença de dentes supranumerários, sendo mais frequente na dentadura permanente e predominante na região anterior da maxila, com maior incidência no gênero masculino. O mesiodens é o supranumerário mais comum, podendo causar alterações como apinhamento, diastemas, atraso eruptivo e comprometimento estético e funcional. Sua etiologia ainda é controversa, sendo atribuída principalmente à hiperatividade da lâmina dental, além de possíveis fatores hereditários.

## OBJETIVO

Relatar um caso clínico ortodôntico de má oclusão Classe I associada à erupção ectópica de incisivos laterais superiores induzida pela presença de mesiodens na dentadura mista, descrevendo a abordagem terapêutica adotada para correção da má oclusão e restabelecimento da função e estética por meio da remoção do supranumerário e reposicionamento adequado dos dentes envolvidos

## RELATO DE CASO

Paciente do gênero feminino, 12 anos, em dentadura mista, apresentou má oclusão Classe I associada à presença de mesiodens, erupção ectópica palatina dos incisivos laterais superiores, apinhamento e mordida cruzada anterior. Os exames clínicos e radiográficos confirmaram o diagnóstico, sendo indicada a exodontia do supranumerário seguida de tratamento ortodôntico fixo com mecânica fio sobre fio para reposicionamento dentário. Após 26 meses de tratamento, observou-se correção da má oclusão, adequada intercuspidação e melhora funcional e estética, com estabilidade do padrão facial e instalação de contenções adequadas.

## DETALHAMENTO CLÍNICO


















## RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise cefalométrica comparativa evidenciou efeitos esqueléticos e dentoalveolares significativos, com crescimento maxilar e mandibular, correção da discrepância esquelética inicial e redução da sobremordida, sem alterações relevantes no perfil facial. O tratamento consistiu na exodontia do supranumerário associada à ortodontia fixa, com uso de colagem invertida para adequado controle de torque radicular. Os resultados finais confirmaram a eficácia da abordagem adotada, proporcionando correção da má oclusão, estabilidade dentária e melhora funcional e estética

## CONCLUSÃO

O tratamento ortodôntico fixo associado à remoção do mesiodens promoveu a correção da má oclusão Classe I e o adequado reposicionamento dos incisivos laterais superiores. Como resultado, obteve-se alinhamento dentário satisfatório, com recuperação da harmonia do sorriso e da estética facial.