JUAN ALBERTO MARTINEZ QUEZADA

ENXERTO DE BLOCO NA SEÇÃO ANTERIOR

CURITIBA/PR

2024

Juan Alberto Martinez Quezada

ENXERTO DE BLOCO NA SEÇÃO ANTERIOR

Monografia apresentada ao curso de Especialização *Lato Sensu* da Faculdade Sete Lagoas - FACSETE, como requisito parcial a obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Área de concentração: Odontologia.

Orientador: Prof. Dr. Jairo Marcos Gross

Curitiba

2024

FACSETE

FACULDADE SETE LAGOAS
Portaria MEC 278/2016 DOU 19/04/2016
Portaria MEC 946/2016 DOU 19/08/2016

FOLHA DE APROVAÇÃO

Juan Alberto Martinez Quezada

ENXERTO DE BLOCO NA SEÇÃO ANTERIOR

Monografia apresentada ao programa em Pós-graduação em Odontologia da Faculdade Sete Lagoas – FACSETE, como requisito parcial para obtenção do título em especialista em Implantodontia.

Aprovado pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores:

PROF.DR. JAIRO MARCOS GROSS GROSS Orientador

PROFA .Dra ANDREA GROSS 1º Membro

A

PROF. ESP. EDUARDO ADNAN ISSA 2° Membro

Curitiba, 25 de Novembro de 2024.

DEDICATÓRIA

Agradeço a Deus, fonte de inspiração e orientação ao longo deste percurso académico, cujo A sabedoria e o amor têm sido a força motriz de cada conquista alcançada. Em cada página de Neste projeto, minha profunda gratidão se reflete pela sua presença constante, que iluminou meu caminho e fortaleceu minha fé em tempos de desafio. Deus misericordioso, eu elevo meu mais alto sincera gratidão por ser minha rocha inquebrável e meu porto seguro nesta jornada rumo ao conhecimento.

À minha querida esposa, Claudia Sierra, e aos meus queridos filhos, dedico este trabalho com profundo apreço e gratidão. Obrigado pela sua paciência, compreensão e apoio incondicional que eles têm tem sido o pilar sobre o qual cada avanço acadêmico foi construído. Claudia, seu sacrifício e seu amor incondicional têm sido minha maior motivação, e aos meus filhos, agradeço pela sua compreensão e por ser minha fonte constante de alegria e esperança. Esta revisão bibliográfica também lhes pertence, refletindo o amor e o esforço partilhado que tornaram isto possível. realização profissional.

AGRADECIMENTOS

Quero expressar meus mais profundos agradecimentos aos meus estimados professores, especialmente Jairo Gross, Alexander Moncada e Andrea Gross, colegas de pós-graduação e amigos. Seu apoio apoio incondicional e sua sabedoria compartilhada foram elementos essenciais no meu caminho para culminação deste programa acadêmico. Cada interação com você foi uma oportunidade crescer e aprender, e estou sinceramente grato pela sua generosidade em compartilhar seu conhecimento e experiência. Eles têm sido uma inspiração constante para mim e contribuíram significativamente para o meu desenvolvimento profissional e pessoal.

Aos pacientes que participaram do meu programa de pós-graduação, sou eternamente grato. Sua valiosa contribuição e confiança em meu trabalho foram uma honra e um privilégio. Suas histórias e experiências têm estado no centro da minha pesquisa e prática clínica, e todos os dias me motivam a se esforce mais para fornecer atendimento de qualidade que atenda às suas necessidades. Eu Agradeço sinceramente por me permitir fazer parte de sua jornada pela saúde e por me ensinar a importância da empatia e do comprometimento na profissão médica.

“E agora, que toda a glória é para Deus, que pode realizar muito mais do que nós poderíamos peça ou mesmo imagine através do seu grande poder, que atua em nós.”

Efésios: 3:20 NTV

RESUMO

O enxerto em bloco é essencial para a regeneração óssea do setor anterior, permitindo a restauração da função mastigatória e da estética facial. Embora os enxertos autógenos sejam os mais eficazes, também são utilizados enxertos alogênicos e xenogênicos, embora com maior risco de reabsorção. Uma correta integração do enxerto oferece um bom suporte aos implantes dentários, evitando o colapso facial. Além disso, o enxerto em bloco auxilia na recuperação da simetria facial e das funções de mastigação e fonação. As complicações mais comuns, como reabsorção óssea ou exposição do enxerto, podem ser tratadas com bom acompanhamento pós-operatório. Os avanços na impressão 3D, nos biomateriais e nas células estaminais estão a melhorar consideravelmente a regeneração óssea.

Palavras-chave: Enxerto em bloco. Regeneração óssea. Estética facial. Implante dentário. Impressão 3D. Biomateriais. Células-tronco.

ABSTRACT

The block graft is essential for bone regeneration in the anterior sector, allowing the restoration of masticatory function and facial aesthetics. Although autogenous grafts are the most effective, allogeneic and xenogeneic grafts are also used, although with a greater risk of resorption. Correct integration of the graft offers good support to dental implants, preventing facial collapse. Furthermore, the block graft helps to recover facial symmetry and chewing and speaking functions. The most common complications, such as bone resorption or graft exposure, can be treated with good postoperative follow-up. Advances in 3D printing, biomaterials and stem cells are significantly improving bone regeneration.

Keywords: Block graft. Bone regeneration. Facial aesthetics. Dental implant. 3D printing. Biomaterials. Stem cells.

LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÔNIMOS

BMP	Proteínas Morfogenéticas Ósseas (Osso Proteínas Morfogéticas)
VEGF	Fator de crescimento endotelial vascular (Fator de Crescimento Endotelial Vascular).
ROG	Regeneração Óssea Guiada.
CT	tomografia computadorizada
3D	Impressão Tridimensional (Três-Impressão dimensional)
CAD/CAM	Projeto assistido por computador/ Fabricação auxiliada por computador (Design Assistido por Computador /Computador – FABRICAÇÃO AUXILIADA)
PTH	Hormônio PARATÓIDE (Paratireóide Homônio)

LISTA DE FIGURAS

FIgura1: Simetria.....13

Figura 2: Enxerto em bloco.....14

Figura 3: Setor anterior de anatomia e fisiologia.....15

Figura 4: Função estética.....16

Figura 5: Coleta de enxerto.....22

Figura 6: Cama receptora.....23

Figura 7: Fixação do enxerto.....23

Figura 8: Fechamento cirúrgico.....24

Figura 9: Estética facial.....31

Figura 10: Guias cirúrgicas de impressão 3D.....36

Figura 11: Nanotecnologia.....36

Figura 12: Usos de células-tronco.....37

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....12

2. DESENVOLVIMENTO.....13

2.1 Revisão de literatura.....10

2.1.1 Definição de enxerto em bloco.....11

2.1.2 Anatomia e Fisiologia do Setor Anterior da Boca.....12

2.1.3 Estruturas ósseas.....17

2.1.4 Indicações e contra-indicações dos enxertos em bloco do setor anterior. Indicações para enxerto em bloco no setor anterior.....15

2.1.5 Tipos de Enxertos em Bloco Utilizados no Setor Anterior.....19

2.1.6 Técnicas cirúrgicas e considerações pré-operatórias em enxerto em bloco.....18

2.1.7 Complicações e manejo pós-operatório em enxertos em bloco.....24

2.1.8 Cuidados pós-operatórios e protocolos de cuidados.....27

2.1.9 Avaliação da estética facial em enxertos em bloco.....29

2.1.10 Avaliação da estética facial e recuperação funcional em enxertos em bloco.....32

2.1.11 Avanços tecnológicos e pesquisas futuras abordam enxertos em bloco.....32

2.2 Discussão.....36

3. CONCLUSÃO.....37

REFERÊNCIAS.....39

1. INTRODUÇÃO

Os enxertos em bloco tornaram-se uma técnica fundamental na regeneração óssea do setor anterior da boca, área fundamental tanto para a estética facial quanto para a função oral. A perda óssea nesta região pode afetar gravemente a simetria facial, o suporte labial e a capacidade do paciente de mastigar e falar adequadamente. Esta técnica cirúrgica é utilizada para restaurar o volume ósseo, permitindo a correta colocação de implantes dentários e melhorando a funcionalidade e aparência do paciente. Nos últimos anos, avanços significativos foram obtidos no uso de biomateriais, fatores de crescimento e tecnologias como a impressão 3D, permitindo maior precisão e previsibilidade nos resultados desses procedimentos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão de literatura

A importância do setor anterior da boca (dentes anteriores e estruturas associadas) na estética facial é crucial, pois influencia diretamente na harmonia da face e na percepção da beleza. O sorriso é um componente chave na comunicação não verbal, e os dentes anteriores desempenham um papel central nesta expressão. Abaixo estão alguns aspetos principais:

- Proporção e simetria



Figura 1: Simetria.

Os dentes anteriores devem estar em harmonia com as demais estruturas faciais, como lábios e nariz, para criar uma estética agradável. A proporção ideal entre a largura e o comprimento dos dentes, bem como o seu alinhamento e simetria, são elementos essenciais para um sorriso esteticamente equilibrado.

De acordo com Gillen *et al.* (1994), o tamanho, forma e posição dos dentes anteriores são determinantes para a estética facial. A proporção áurea é comumente usada para determinar as dimensões ideais entre os dentes anteriores.

- Cor e textura dentária

A cor dos dentes anteriores influencia a perceção de saúde e juventude. Uma cor branca natural e uniforme está associada à juventude, enquanto manchas ou descolorações podem afetar negativamente a aparência facial. Além disso, a textura dos dentes, como a opacidade e o brilho, também contribui para a perceção estética do sorriso. Kokich *et al.* (2006), destacaram que mesmo pequenas incompatibilidades no alinhamento ou na cor dos dentes anteriores podem afetar significativamente a perceção estética de uma pessoa.

- Influência na autoestima e na confiança

Um setor anterior esteticamente agradável pode melhorar a confiança e a autoestima de uma pessoa. Estudos em psicologia dentária indicam que um sorriso atraente tem um impacto positivo nas interações sociais e na perceção de competição e atratividade física (Punchon *et al.,* 2014).

- Posição gengival

A exposição das gengivas ao sorrir, principalmente no setor anterior, também desempenha um papel importante. O excesso de exposição gengival (sorriso gengival) ou a assimetria na linha gengival podem afetar a estética do sorriso (Garber & Salama, 1996).

2.1.1 Definição de enxerto em bloco



Figura 2: Enxerto em bloco.

O enxerto em bloco é uma técnica cirúrgica utilizada em Implantologia e Cirurgia Maxilofacial para restaurar defeitos ósseos tridimensionais. Geralmente é utilizado quando há quantidade insuficiente de osso nas áreas da maxila ou mandíbula, o que impede a correta colocação dos implantes dentários. O enxerto em bloco consiste na transferência de um bloco de osso (autógeno, alógeno ou sintético) de outra parte do corpo ou de um doador para a área afetada, proporcionando volume ósseo adequado para suportar os implantes. A vantagem desta técnica em relação a outros procedimentos de aumento ósseo é a sua capacidade de proporcionar um suporte tridimensional mais preciso, o que permite a restauração de grandes defeitos ósseos numa única intervenção cirúrgica.

- Bloquear objetivos de enxerto

1. Aumento ósseo tridimensional: O principal objetivo do enxerto em bloco é restaurar o

volume ósseo nas três dimensões (largo, alto e profundo) em áreas onde ocorreu reabsorção significativa. Isto é crucial para garantir o sucesso dos implantes dentários.

2. Estabilidade do implante: Ao fornecer uma base óssea sólida e volumétrica, o enxerto em bloco permite que os implantes dentários se integrem corretamente ao osso (osteointegração), aumentando a sua estabilidade e durabilidade a longo prazo.

3. Função estética e mastigatória: O enxerto em bloco não só melhora a funcionalidade mastigatória, mas também recupera a forma e aparência natural da mandíbula ou maxila, o que é essencial em áreas estéticas (por exemplo, o setor anterior da boca).

4. Correção de defeitos ósseos: Esta técnica é particularmente útil nos casos em que o osso sofreu perdas devido a traumas, infecções ou extrações dentárias. O enxerto em bloco ajuda a corrigir esses defeitos e a restaurar a anatomia óssea.

2.1.2 Anatomia e fisiologia do setor anterior da boca



Figura 3: Setor anterior de anatomia e fisiologia.

O setor anterior da boca inclui estruturas essenciais para funções estéticas e fonéticas e mastigatório. Inclui os dentes anteriores (incisivos e caninos), tecidos moles circundantes, gengivas e osso alveolar subjacente. A importância deste setor reside na sua visibilidade ao sorrir, falar e mastigação, tornando-se um componente chave na harmonia facial.

- Anatomia e fisiologia do setor anterior da boca

O setor anterior da boca, composto pelos dentes incisivos e caninos, desempenha papel fundamental tanto na estética facial quanto nas funções orais, como mastigação e fala. A correta disposição e funcionamento dessas estruturas é crucial para o equilíbrio da harmonia facial, pois é a parte mais visível durante o sorriso e a comunicação verbal (Al-Ani *et al.,* 2012).

- Anatomia do setor anterior

Dentes incisivos e caninos: Os incisivos (centrais e laterais) e caninos são os dentes mais importantes do setor anterior. Os incisivos têm função cortante, enquanto os caninos, por

sua estrutura mais robusta e pontiaguda, têm função cortante (Marini *et al.,*2015). Estes dentes são cruciais não só pela sua funcionalidade, mas também pela sua contribuição para a estética facial.

Osso alveolar: O osso alveolar sustenta as raízes dos dentes e é constantemente remodelado devido às forças de mastigação. É fino no setor anterior, o que o torna mais propenso à reabsorção após a perda dentária (Misch, 2008).

Goma aderida e marginal: As gengivas cobrem o osso alveolar e circundam os dentes, protegendo-os. A gengiva inserida, quando queratinizada, proporciona suporte firme, enquanto a gengiva marginal circunda os colos dentários, criando uma vedação entre os dentes e os tecidos moles (Zucchelli; de Sanctis, 2007).

Lábios e músculos periorais: Os músculos que circundam a boca, como o orbicular da boca Eles desempenham um papel essencial na função estética e na fala. Os lábios, por estarem em contato com os dentes, também são importantes para a fonética, pois auxiliam na articulação de determinados sons (Al-Ani *et al.,* 2012).

- Fisiologia do setor anterior



Figura 4: Função estética.

1- Função Estética: A posição e a aparência dos dentes anteriores são fundamentais para a estética facial. O correto alinhamento dos incisivos e caninos é essencial para um sorriso harmonioso e equilibrado, influenciando a percepção estética global da face (Marini *et al.,* 2015).

2- Função Fonética: Os dentes anteriores desempenham um papel crucial na produção de sons. Os incisivos superiores, por exemplo, interagem com os lábios e a língua para formar sons fricativos como “f” e “v” (Al-Ani et al., 2012).

3- Função mastigatória: Os dentes anteriores também são fundamentais no processo mastigatório. Os incisivos cortam o alimento, enquanto os caninos rasgam, preparando o alimento para posterior mastigação pelos dentes posteriores (Misch, 2008).

4- Manutenção da Estrutura Óssea: A presença e função dos dentes anteriores são fundamentais para evitar a reabsorção do osso alveolar. Após a perda dentária, a falta de estimulação mecânica provoca reabsorção óssea, afetando não só a funcionalidade, mas também a estética da face (Misch, 2008).

- Alterações Fisiológicas e Patológicas

1- Reabsorção óssea pós-extração: A reabsorção óssea alveolar após a perda dos dentes anteriores é um processo comum que pode afetar a harmonia estética facial. Essa perda óssea pode gerar colapso do perfil facial, alterando significativamente a estética (MISCH, 2008).

2- Doenças periodontais: O setor anterior é vulnerável às doenças periodontais, que podem causar perda de suporte ósseo e de potência dentária. Essas condições podem levar à perda dentária e maior reabsorção óssea (Zucchelli & de Sanctis, 2007).

3- Impacto do envelhecimento: Com o envelhecimento, a estrutura óssea e Os tecidos moles do setor anterior tendem a enfraquecer. Isto afeta tanto o funcionalidade como estética, reduzindo a estabilidade dos dentes e alterando a aparência facial (Misch, 2008).

O setor anterior da boca desempenha um papel vital na estética facial e na funcionalidade oral. A correta disposição dos dentes incisivos e caninos, juntamente com o osso alveolar e a gengiva, é crucial para o equilíbrio dessas funções. Intervenções restauradoras, como enxertos ósseos ou implantes, são essenciais para manter a integridade deste setor quando ocorrem perdas dentárias ou alterações patológicas.

2.1.3 Estruturas ósseas e dentárias relevantes

Estruturas ósseas do setor anterior

O setor anterior da boca é composto por ossos importantes, como maxila e mandíbula. O osso alveolar que circunda os dentes anteriores é essencial para a estabilidade dentária e a estética facial. A integridade e espessura deste osso são essenciais, principalmente em tratamentos de implantologia e regeneração óssea. Em particular, a espessura do osso oral (Espessura Óssea Bucal) tem sido uma questão relevante para determinar a viabilidade de implantes dentários imediatos. No caso da mandíbula anterior, estudos mostram que em mais de 60% dos casos, a espessura do osso oral na crista alveolar é inferior a 1 mm, o que sublinha a importância de uma avaliação pré- cirúrgica cuidadosa para o planeamento do enxerto. osso quando necessário (Schiegnitz *et al.,* 2021).

Estruturas dentárias

Quanto às estruturas dentárias do setor anterior, os dentes incisivos e caninos

desempenham um papel essencial na função estética e mastigatória. Esses dentes têm raízes longas que requerem suporte ósseo adequado para manter sua funcionalidade e estabilidade a longo prazo. As características anatômicas dessas raízes e do osso circundante variam significativamente entre os indivíduos, o que implica na necessidade de planejamento personalizado nos procedimentos de restauração dentária. Além disso, a presença de biofilmes nas superfícies dentárias pode influenciar a saúde periodontal, o que por sua vez impacta a integridade das estruturas ósseas que sustentam os dentes (BMC Oral Health, 2021).

Vascularização e biologia óssea

A vascularização do osso alveolar no setor anterior é essencial para a manutenção da saúde óssea e cicatrização após intervenções cirúrgicas. O fluxo sanguíneo nesta região garante o fornecimento de nutrientes para a regeneração óssea, principalmente em procedimentos que envolvem enxertos ósseos ou colocação de implantes. O osso maxilar e mandibular possui uma vascularização complexa que deve ser considerada durante qualquer intervenção para evitar complicações pós-operatórias.

As estruturas ósseas e dentárias do setor anterior desempenham um papel crucial na estética facial e na funcionalidade dentária. O conhecimento profundo da anatomia e das características fisiológicas desta região é essencial para o sucesso dos procedimentos cirúrgicos e restauradores em odontologia. A avaliação da espessura óssea e o planeamento de intervenções personalizadas são aspetos fundamentais para o sucesso dos tratamentos a longo prazo.

2.1.4 Indicações e contra indicações dos enxertos em bloco do setor anterior. Indicações para enxerto em bloco no setor anterior

1. Defeitos ósseos graves: Indicados em casos de perda óssea significativa, onde a regeneração óssea espontânea é insuficiente (Jung *et al.,* 2013).
2. Implantes dentários: Ideais para pacientes que necessitam de colocação de implantes em áreas de volume ósseo limitado, proporcionando uma base mais estável (Esposito *et al.,* 2010).
3. Correção de deformidades estéticas: É utilizado para restaurar a forma e o contorno da mandíbula anterior, melhorando assim a estética facial e dentária (Gonzalez *et al.,* 2015).
4. Doença periodontal avançada: Em pacientes com perda óssea devido à doença periodontal, o enxerto em bloco pode ser uma opção para restaurar a estrutura óssea (Garg *et al.,* 2011).

Bloquear contra indicações do enxerto no setor anterior

1. Doenças sistêmicas: Pacientes com doenças sistêmicas não controladas, como diabetes não controlada ou distúrbios de coagulação, podem não ser candidatos ideais (Friedman et al., 2013).

2. Infecções locais: A presença de infecções na área de tratamento pode contraindicar o uso de enxertos em bloco (Zitzmann, Marinello, 2006).

3. Falta de cooperação do paciente: pacientes que não conseguem seguir as indicações pós-operatórias podem enfrentar maior risco de complicações (Albrektson *et al.,* 2012).

4. Histórico de radioterapia na área: a radioterapia prévia na área a ser tratada pode afetar a cicatrização e integração do enxerto (Rocchietta *et al.,* 2013).

2.1.5 Tipos de enxertos em bloco utilizados no setor anterior

Os enxertos em bloco são uma técnica fundamental na reconstrução óssea de defeitos do setor anterior da boca, principalmente em situações onde a quantidade de osso é insuficiente para a colocação de implantes dentários. Existem vários tipos de enxertos em bloco, que são classificados principalmente de acordo com sua origem. Podem ser enxertos autógenos, alogênicos, xenogênicos e aloplásticos. Cada um deles possui características particulares que afetam sua integração, taxa de sucesso e possíveis complicações.

Origem e características dos enxertos em bloco

A utilização de enxertos em bloco para reconstrução óssea no setor anterior da boca tem origem na necessidade de restaurar tanto o volume quanto a qualidade do osso em pacientes com defeitos graves, seja por reabsorção óssea após perda dentária, trauma ou trauma congênito malformações. O enxerto em bloco caracteriza-se pela capacidade de fornecer grande volume de osso em um único procedimento cirúrgico, o que facilita a regeneração e permite a colocação de implantes dentários com maior estabilidade a longo prazo (Carinci *et al.,* 2020).

Enxertos autógenos

Os enxertos autógenos, obtidos do próprio paciente, são considerados “padrão ouro” em procedimentos de regeneração óssea. Sua principal vantagem é não gerar reações imunológicas adversas, uma vez que o tecido transplantado é geneticamente idêntico ao receptor. Esses enxertos também possuem propriedades osteogênicas, osteoindutoras e osteocondutoras, o que significa que têm a capacidade de formar novo osso diretamente, induzir a formação óssea pelas células circundantes e servir como estrutura para a regeneração óssea (Zouhary, 2010). No entanto, a principal desvantagem é a morbidade do local doador, pois o procedimento

envolve a retirada de osso de outras áreas, como mandíbula ou crista ilíaca.

Enxertos alogênicos

Os enxertos alogênicos vêm de doadores humanos diferentes do receptor, mas da mesma espécie. Eles são processados e esterilizados para minimizar o risco de transmissão de doenças e rejeição imunológica. Embora não possuam propriedades osteogênicas, mantêm características osteocondutoras e osteoindutoras, o que os torna uma alternativa viável aos autoinjetos. Sua principal vantagem é não necessitar de segunda intervenção cirúrgica para obtenção do material, o que reduz o tempo operatório e a morbidade (Buser et al., 2019). Porém, apresentam maior taxa de reabsorção que os enxertos autógenos, o que pode comprometer o volume ósseo a longo prazo.

Enxertos xenogênicos

Os enxertos xenogênicos são obtidos de uma espécie diferente, como o bovino. Eles passam por um processamento rigoroso para eliminar qualquer componente imunogênico. Esses enxertos oferecem excelente capacidade osteocondutora, pois atuam como arcabouço para regeneração óssea do paciente. Porém, não possuindo propriedades osteoindutoras ou osteogênicas, dependem completamente da capacidade óssea circundante para colonizá-los e formar novo osso (Araújo *et al.,* 2010). Sua principal vantagem é a disponibilidade ilimitada, mas sua integração costuma ser mais lenta do que no caso do autoinje.

Comparação de diferentes tipos de enxertos

Enxertos autógenos: Embora sejam o padrão-ouro devido à sua capacidade osteogênica, seu uso pode ser limitado pela morbidade do sítio doador e pela quantidade de osso disponível. A taxa de sucesso é geralmente alta, mas o procedimento pode ser invasivo e aumentar o risco de complicações na área doadora (Zouhary, 2010).

Enxertos alogênicos: São uma opção menos invasiva, pois eliminam a necessidade de área doadora, mas sua eficácia em longo prazo pode ser comprometida devido à maior reabsorção do material transplantado. Embora sejam osteocondutores e osteoindutores, carecem de propriedades osteogénicas, o que poderia limitar a sua capacidade de formar novo osso de forma autónoma (Buser *et al.,* 2019).

Enxertos xenogênicos: Eles oferecem ótima disponibilidade e excelente capacidade osteocondutiva, mas como não são osteoindutores nem osteogênicas, dependem completamente das células ósseas do destinatário para sua regeneração. Embora sua integração seja mais lenta, eles geralmente são úteis nos casos em que um grande volume de

osso é necessário e não há osso autógeno suficiente disponível (Araújo *et al.,* 2010).

A escolha do tipo de enxerto depende de múltiplos fatores, como disponibilidade óssea, preferências do paciente e do cirurgião e características específicas do defeito ósseo a ser reparado. Os autoenxertos oferecem os melhores resultados a nível biológico, enquanto os enxertos alogénicos e xenogénicos proporcionam soluções menos invasivas mas com algumas limitações em termos da sua integração e estabilidade a longo prazo.

2.1.6 Técnicas cirúrgicas e considerações pré-operatórias em enxerto em bloco

O enxerto em bloco é uma técnica avançada em cirurgia oral e maxilofacial que requer avaliação minuciosa do paciente e planejamento cirúrgico cuidadoso. A regeneração óssea no setor anterior da boca é especialmente complexa devido à necessidade de manter a funcionalidade e a estética facial. Próximo, são descritas as principais considerações pré-operatórias, etapas e procedimentos cirúrgicos envolvidos na colocação de um enxerto em bloco. Avaliação pré-operatória do paciente A avaliação pré-operatória é uma etapa crucial para o sucesso da cirurgia de enxerto em bloco. Esse processo inclui histórico médico detalhado, exames clínicos e radiográficos e avaliação dos fatores de risco associados ao procedimento.

1.História médica e antecedentes médicos: O cirurgião deve considerar fatores como doenças sistêmicas, hábitos do paciente (tabagismo, consumo de álcool) e medicamentos que possam interferir na consolidação óssea ou no metabolismo. Pacientes com diabetes não controlada, doenças autoimunes ou terapias com bifosfonatos apresentam maior risco de complicações (Chiapasco *et al.,* 2009).

2. Avaliação radiográfica: O diagnóstico por imagem por tomografia computadorizada (TC) ou radiografias tridimensionais é essencial para determinar o volume ósseo disponível e planejar o tamanho e localização do enxerto. O planejamento virtual da cirurgia utilizando software 3D também pode melhorar a precisão do procedimento, reduzindo erros na colocação do enxerto (Albanese *et al.,* 2010).

3. Análise estética e funcional: No setor anterior, a regeneração óssea deve aliar funcionalidade e estética. É fundamental que o enxerto mantenha a forma e o contorno do osso alveolar para evitar irregularidades visíveis no perfil facial, principalmente em pacientes com sorriso alto.

Considerações pré-operatórias

Antes do procedimento, é importante que o cirurgião discuta com o paciente as expectativas em relação aos resultados, possíveis complicações e plano de tratamento pós-operatório. Devem ser fornecidas instruções específicas sobre os cuidados pré- cirúrgicos, como

a interrupção de determinados medicamentos, a cessação do consumo de tabaco e uma dieta adequada para favorecer a cura (Jensen *et al.,* 2014). Além disso, o manejo dos tecidos moles é essencial para evitar complicações relacionadas à cicatrização. O planejamento inclui a escolha de técnicas de incisão que permitam a exposição adequada da área cirúrgica sem comprometer o suprimento vascular do tecido circundante (Misch, 2015).

Etapas e procedimentos cirúrgicos

O procedimento cirúrgico para um enxerto de bloco envolve vários estágios, cada um dos quais deve ser realizado com precisão para garantir a integração adequada do enxerto e a regeneração óssea desejada.



Figura 5: Coleta de enxerto.

1- Acesso cirúrgico e colheita de enxerto: Sim

Este é um enxerto autógeno, o procedimento começa com a coleta do bloco ósseo do local doador, que geralmente é o ramo mandibular ou o queixo. Uma incisão é feita no local doador e o bloco de osso é removido com ferramentas especializadas, como serras piezoelétricas, o que minimiza os danos térmicos ao osso circundante (Jensen *et al.,* 2014).

2- Preparação da cama de recebimento: Na área onde

Colocará o enxerto, é realizada uma ligeira descalcificação do osso do destinatário para garantir uma boa integração entre o enxerto e o osso subjacente. O local do destinatário deve ser perfeitamente adaptado ao tamanho e forma do bloco ósseo para garantir a estabilidade primária adequada (Sánchez *et al.,* 2018).



Figura 6: Cama receptora.

3- Fixação de enxerto:

Uma vez adaptado, o bloco ósseo ele é fixado com microparafusos de titânio. A estabilidade do enxerto é fundamental, pois os movimentos durante o processo de cicatrização podem interferir na integração. O uso de membranas de colágeno reabsorvíveis no enxerto pode melhorar a estabilidade e promover a regeneração dos tecidos moles (Urban *et al.,* 2012).



Figura 7: Fixação do enxerto.

4- Fechamento cirúrgico:

Após fixação dos tecidos moles, garantindo que não haja cicatrizes. O uso de suturas não reabsorvíveis é comum neste tipo de cirurgia (Misch, 2007).




Figura 8: Fechamento cirúrgico.

5- Cuidados pós-operatórios:

Os cuidados pós-operatórios incluem cuidado com a administração de antibióticos profiláticos, anti inflamatórios e analgésicos para reduzir o risco de infecção e controlar a dor. Recomenda-se ao paciente seguir uma dieta leve durante as primeiras semanas e evitar qualquer tipo de pressão na área operada. As visitas de acompanhamento são essenciais para avaliar a integração do enxerto e monitorar o progresso da cicatrização (Albanese *et al.,* 2010).

Considerações adicionais

Durante o planejamento cirúrgico é importante selecionar a técnica adequada com base nas características individuais do paciente e no defeito ósseo que deve ser tratado. Por exemplo, os enxertos em bloco podem ser precedidos ou acompanhados por outras técnicas como a expansão alveolar ou o uso de enxertos particulados para complementar o volume ósseo e melhorar a estabilidade do implante (Chiapasco *et al.,* 2009). Por fim, o sucesso da enxertia em bloco depende não apenas da técnica cirúrgica, mas também do manejo adequado dos fatores sistêmicos do paciente, da qualidade do osso doador e receptor e do acompanhamento pós-operatório.

2.1.7 Complicações e manejo pós-operatório em enxertos em bloco

O procedimento de enxerto em bloco no setor anterior da boca, embora altamente eficaz para a regeneração óssea, pode estar associado a diversas complicações pós-operatórias. Estas complicações podem influenciar a integração do enxerto, a estabilidade dos implantes e a estética final. A identificação e o manejo adequado das complicações pós-operatórias são essenciais para garantir o sucesso do tratamento em longo prazo. As complicações mais comuns e as abordagens recomendadas para o seu manejo são detalhadas abaixo.

Reabsorção do enxerto

Uma das complicações mais comuns nos enxertos em bloco é a reabsorção do material

ósseo transplantado. Embora todos os enxertos sofram algum grau de reabsorção, a reabsorção excessiva pode comprometer o volume ósseo necessário para a colocação do implante ou afetar a estética final do setor anterior (Chiapasco *et al.,* 2009). A reabsorção é mais comum em enxertos alogênicos e xenogênicos, devido à natureza desses materiais.

- Monitoramento pós-operatório: Recomenda-se controles radiográficos periódicos para avaliar a estabilidade do enxerto e detectar sinais de reabsorção prematura. Em casos de reabsorção significativa, podem ser necessários procedimentos adicionais de regeneração óssea para restaurar o volume perdido (Buser *et al.,* 2019).
- Uso de membranas: O uso de membranas reabsorvíveis ou não reabsorvíveis pode minimizar a reabsorção do enxerto, criando uma barreira que protege o enxerto durante sua integração (Urban *et al.,* 2012).
- Técnicas cirúrgicas adequadas: a fixação estável do enxerto com parafusos de titânio pode reduzir o risco de reabsorção.
- Avaliação radiográfica periódica: O controle radiográfico durante os primeiros seis meses é essencial para monitorar o estado do enxerto e detectar sinais de reabsorção precoce (Urban *et al.,* 2012).

Infecção

A infecção pós-operatória é uma complicação grave que pode comprometer tanto o enxerto quanto o resultado final do procedimento. As infecções geralmente estão relacionadas à contaminação bacteriana durante ou após a cirurgia, especialmente se as diretrizes apropriadas de assepsia não forem seguidas.

Gerenciamento:

Profilaxia antibiótica: Recomenda-se a administração profilática de antibióticos antes e depois da cirurgia para prevenir infecções. Antibióticos de amplo espectro, como amoxicilina ou clindamicina, são comumente usados
(Chiapasco et al., 2009).

Limpeza cirúrgica e desbridamento: Em caso de infecção é fundamental realizar uma limpeza cirúrgica e, se necessário, desbridar a área afetada para eliminar o tecido infectado. A reexploração cirúrgica e a irrigação com soluções antissépticas podem ser necessárias em casos graves.

Drenagem cirúrgica: caso se desenvolva um abscesso, é necessária uma drenagem imediata da área afetada juntamente com a administração adequada de antibióticos (Urban *et*

al., 2012).

Exposição do enxerto

A exposição do enxerto é outra complicação comum, que ocorre quando os tecidos moles que recobrem o enxerto se abrem ou retraem, expondo o material ósseo transplantado. Isto pode aumentar o risco de infecção e reembolso do enxerto, além de afetar a estética do tratamento.

Gerenciamento:

Fechamento primário adequado: A chave para evitar a exposição do enxerto é conseguir o fechamento primário dos tecidos moles sem tensão. O manuseio cuidadoso dos retalhos durante a cirurgia é essencial para garantir uma cobertura adequada do enxerto (Misch, 2015).

Reparo cirúrgico: Caso ocorra exposição, o manejo inicial consiste em proteger a área exposta com medidas locais, como uso de géis antimicrobianos e enxaguantes bucais antissépticos. Em casos mais avançados pode ser necessária intervenção cirúrgica adicional para cobrir o enxerto exposto com um novo retalho de tecido (Urban *et al.,* 2012).

Cuidados locais: Em caso de exposição, o uso de enxaguantes antissépticos e a aplicação de géis antimicrobianos podem reduzir o risco de infecção. Em casos graves, pode ser necessário um segundo procedimento cirúrgico para cobrir o enxerto exposto (Urban *et al.,* 2012).

Dor e edema pós-operatório

Dor e edema são efeitos comuns após cirurgia de enxerto em bloco. Embora geralmente controláveis, a dor excessiva ou o edema prolongado podem indicar complicações subjacentes, como infecção ou exposição do enxerto.

Gerenciamento:

Analgesia adequada: Recomenda-se o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como ibuprofeno ou cetorolaco, para controle da dor pós-operatória. Em alguns casos, pode ser necessário recorrer a analgésicos mais fortes, como os opioides, embora isto deva ser avaliado com cautela (Buser *et al.,* 2019).

Medidas antiinflamatórias: O uso de compressas frias nas primeiras 24-48 horas de pós-operatório pode reduzir significativamente o edema. Em casos de edema grave ou persistente, os corticosteróides podem ser úteis para reduzir a inflamação (Jensen *et al.,* 2014).

Mobilidade do enxerto

A mobilidade do enxerto, principalmente no pós-operatório inicial, pode comprometer a integração do enxerto ao osso receptor. A estabilidade primária é essencial para permitir a

regeneração óssea e evitar a falha do enxerto.

Gerenciamento:

Fixação adequada: A fixação do enxerto com parafusos de titânio garante sua estabilidade durante o processo de cicatrização. A revisão periódica e a confirmação da ausência de mobilidade do enxerto nos controles pós- operatórios são fundamentais para o sucesso do procedimento (Chiapasco *et al.,* 2009).

Evite cargas antecipadas: O paciente deve ser orientado a evitar qualquer tipo de carga ou pressão na área cirúrgica durante as primeiras semanas de cicatrização. Isso inclui evitar próteses removíveis na área operada.

Alterações na sensibilidade nervosa

A lesão dos nervos adjacentes durante a cirurgia, principalmente do mento, pode causar parestesia ou perda temporária ou permanente de sensibilidade na região operada. Esse risco é maior em enxertos extraídos da região mandibular.

Avaliação neurológica pré-operatória: Uma avaliação completa das estruturas nervosas próximas deve ser realizada por imagens tridimensionais antes da cirurgia para minimizar o risco de danos. O planejamento preciso é essencial para evitar lesões nervosas (Sánchez *et al.,* 2018).

Monitoramento neurológico: Em caso de alteração da sensibilidade pós-operatória, recomenda-se monitoramento rigoroso do paciente. Na maioria dos casos, a parestesia é temporária e melhora com o tempo, embora em casos graves possa ser necessário recorrer a intervenções neurocirúrgicas.

O manuseio pós-operatório dos enxertos em bloco é uma fase crucial do tratamento, pois influencia diretamente no sucesso do enxerto e na satisfação do paciente. A prevenção, a identificação precoce e o manejo adequado das complicações são fundamentais para garantir uma integração óssea adequada e um resultado estético satisfatório. É essencial que tanto o cirurgião quanto o paciente sigam um protocolo de monitoramento rigoroso para minimizar os riscos e tratar qualquer complicação em tempo hábil.

2.1.8 Cuidados pós-operatórios e protocolos de cuidados

O monitoramento pós-operatório é crucial para identificar qualquer complicação a tempo e garantir uma cura bem sucedida. A seguir descrevemos os cuidados pós-operatórios gerais recomendados.

Controles clínicos periódicos

Controles regulares após a cirurgia são essenciais para monitorar a cicatrização e detectar precocemente possíveis complicações. Recomenda-se realizar uma primeira revisão 1-2 semanas após a cirurgia, seguida de controles mensais durante os primeiros 3 a 6 meses (Buser *et al.,* 2019).

Cuidados domiciliares

O paciente deve seguir uma série de instruções em casa para facilitar a cura:

· Higiene bucal rigorosa: O uso de enxaguatórios bucais antissépticos, como a clorexidina, é essencial nas primeiras semanas de pós-operatório para prevenir infecção.

· Dieta leve: Recomenda-se uma dieta leve para evitar pressão na área operada durante o período inicial de cicatrização (Jensen *et al.,* 2014).

· Evite tabaco e álcool: O tabaco e o álcool podem retardar a cicatrização e aumentar o risco de complicações pós-operatórias, como infecções e reabsorção óssea.

Administração de medicamentos

Analgésicos e antiinflamatórios são prescritos para controle da dor, juntamente com antibióticos profiláticos para prevenir infecções. Em alguns casos, podem ser prescritos corticosteróides para reduzir o edema (Chiapasco *et al.,* 2009).

Controle radiográfico

Radiografias de controle devem ser realizadas para avaliar a integração do enxerto e detectar possíveis complicações, como reabsorção ou mobilidade do enxerto. Recomenda- se uma radiografia inicial às 6-8 semanas de pós-operatório, seguida de verificações periódicas a cada 3-6 meses até ao final do primeiro ano (Urban *et al.,* 2012).

O sucesso dos enxertos em bloco não depende apenas da técnica cirúrgica, mas também de monitoramento e cuidados pós-operatórios adequados. A prevenção de complicações e o seu manejo oportuno são fundamentais para garantir a correta integração do enxerto e o sucesso do tratamento. O acompanhamento regular, juntamente com um protocolo rigoroso de cuidados pós-operatórios, pode reduzir significativamente o risco de complicações graves.

2.1.9 Avaliação da estética facial em enxertos em bloco

A estética facial é fator chave nos procedimentos de enxerto ósseo no setor anterior da boca. Como esta área tem um impacto significativo na aparência facial geral, a avaliação da estética é essencial tanto no planejamento pré-operatório quanto na avaliação dos resultados pós-operatórios. A avaliação da estética facial abrange diversos aspectos, como proporção e

simetria facial, alinhamento dentário, formato do arco alveolar e sustentação labial.

Proporções faciais e simetria

As proporções faciais desempenham um papel essencial na percepção da estética. No setor anterior, a perda de volume ósseo após a extração dentária pode alterar o perfil facial, afetando tanto a forma quanto a simetria. A avaliação da simetria facial é realizada analisando as linhas e proporções faciais, como a linha média da face, a relação entre o nariz e os lábios e a harmonia entre os dentes e as estruturas faciais circundantes.

Manejo no planejamento cirúrgico:

· Imagens tridimensionais: O planejamento cirúrgico por meio de tomografias computadorizadas (TC) e software de simulação 3D permite ao cirurgião visualizar o defeito ósseo e planejar o enxerto com base nas proporções faciais do paciente. Isso garante que o enxerto não apenas restaure a função óssea, mas também mantenha ou melhore a harmonia estética facial (Buser *et al.,* 2019).

· Fotografias pré-operatórias: As fotografias faciais do paciente em diferentes ângulos auxiliam na avaliação das proporções antes do procedimento, o que permite identificar qualquer assimetria facial ou irregularidade que possa necessitar de correção durante a cirurgia (Urban *et al.,* 2012).

Perfil facial e suporte labial

O perfil facial é outro aspecto importante da estética nos procedimentos de enxerto ósseo no setor anterior. A perda de volume ósseo pode fazer com que os lábios percam suporte, afetando tanto a estética quanto a função. O contorno ósseo adequado é essencial para manter o suporte labial correto e evitar o colapso facial que pode causar uma aparência envelhecida ou desequilibrada.

Manejo no planejamento cirúrgico:

· Reconstrução do perfil alveolar: O enxerto em bloco no setor anterior pode restaurar o perfil alveolar, proporcionando suporte adequado aos tecidos moles e melhorando o contorno labial (Chiapasco *et al.,* 2009). A seleção do tamanho e formato do enxerto deve considerar não apenas a quantidade de osso perdido, mas também o suporte necessário para manter a projeção labial.

· Ajuste fino do enxerto: Durante o procedimento cirúrgico, o ajuste do bloco ósseo é fundamental para garantir que o enxerto restaure o perfil facial sem criar protuberâncias ou irregularidades no arco alveolar que prejudiquem a estética.

Relação entre dentes e estruturas faciais

O correto alinhamento dos dentes em relação às estruturas faciais é essencial para uma estética facial harmoniosa. No setor anterior, os dentes desempenham um papel crucial no sorriso, no formato dos lábios e na proporção facial. A falta de suporte ósseo pode afetar negativamente o alinhamento dos dentes e, consequentemente, a estética facial.

Manejo no planejamento cirúrgico:

· Planejamento protético avançado: O planejamento do enxerto em bloco deve incluir uma avaliação dos futuros implantes dentários e das próteses que serão colocadas. A altura, angulação e posição do enxerto ósseo devem ser compatíveis com a localização planeada dos implantes para garantir um alinhamento dentário adequado e esteticamente aceitável (Sánchez *et al.,* 2018).

· Ajuste do arco alveolar: O enxerto em bloco permite restaurar o contorno do arco alveolar, fundamental para a correta disposição dos dentes e sua relação com as estruturas faciais circundantes, como lábios e bochechas.

Um contorno alveolar harmonioso é essencial para conseguir um sorriso natural e esteticamente agradável (Misch, 2015).

Avaliação do sorriso e do corredor bucal

A estética facial não envolve apenas a proporção e a simetria, mas também a relação entre os lábios, os dentes e as gengivas ao sorrir. O corredor oral, ou seja, o espaço visível entre os lábios ao sorrir também deve ser avaliado. Um enxerto inadequado que não restaura volume ósseo suficiente pode levar a um sorriso “afundado” ou desequilibrado.

Manejo no planejamento cirúrgico:

· Avaliação da linha do sorriso: Em pacientes com linha de sorriso alta, a exposição gengival e o contorno ósseo são mais proeminentes, o que torna a estética gengival um fator importante a considerar na cirurgia. Um enxerto em bloco que restaura o volume ósseo adequado pode melhorar a estética da linha do sorriso, criando um contorno gengival natural e atraente (Jensen *et al.,* 2014).

· Usando simulações: No planejamento estético é comum a utilização de simulações digitais que permitem visualizar o resultado estético pós-operatório em termos de sorriso, alinhamento dentário e corredor oral. Estas simulações ajudam tanto o paciente como o cirurgião a alinhar as expectativas e a planear melhor a cirurgia (Sánchez *et al.,* 2018).

A avaliação da estética facial em enxertos em bloco vai além da regeneração óssea;

concentra-se em restaurar a harmonia facial. O planejamento cuidadoso do enxerto em termos de volume, contorno e localização é fundamental para garantir que o resultado atenda não apenas às expectativas funcionais, mas também estéticas. A satisfação do paciente nos procedimentos de enxerto ósseo anterior é altamente dependente da restauração da aparência facial natural, tornando a avaliação estética um componente chave para o sucesso geral do tratamento.

2.1.10 Avaliação da estética facial e recuperação funcional em enxertos em bloco



Figura 9: Estética facial.

Na estética facial como na função mastigatória e fonética do paciente. Como o setor anterior está intimamente relacionado à aparência facial, a avaliação estética correta é fundamental para alcançar resultados satisfatórios. Além disso, a recuperação funcional deve ser cuidadosamente gerenciada para garantir que o paciente recupere não apenas uma aparência esteticamente agradável, mas também uma função oral completa.

Avaliação da estética facial

A estética facial em procedimentos de enxerto em bloco refere-se à restauração de estruturas ósseas e dentárias que contribuem para a harmonia facial. O principal objetivo é restaurar a forma e o volume do osso alveolar perdido para que os dentes e implantes se alinhem naturalmente com as estruturas faciais circundantes, incluindo lábios, gengivas e bochechas.

1. Proporção facial e simetria

A perda óssea no setor anterior pode afetar significativamente a proporção e a simetria da face. Por exemplo, a perda óssea pode causar um colapso do perfil facial, afetando o suporte labial e alterando a harmonia geral do sorriso.

Considerações clínicas:

· Avaliação da linha do sorriso: Em pacientes com sorriso alto, a restauração óssea é fundamental para garantir que as gengivas e os dentes tenham uma aparência natural. Um

enxerto adequado deve restaurar o contorno ósseo necessário para fornecer suporte equilibrado aos tecidos moles (Buser *et al.,* 2019).

· Proporção da arcada dentária: O enxerto de bloco não deve apenas restaurar a altura e a espessura do osso, mas também estar em conformidade com o arco dental natural do paciente para manter uma proporção simétrica entre os dentes anteriores e as estruturas faciais (Jensen et al., 2014).

2. Perfil facial e suporte labial

O perfil facial, principalmente na região peribucal, é extremamente sensível a alterações no volume ósseo. A perda óssea no setor anterior pode levar à retração dos tecidos moles, causando uma aparência "afundada" dos lábios e da região anterior da maxila.

Avaliação e gestão:

· Restauração do perfil alveolar: Durante a cirurgia, utiliza-se enxerto em bloco para restaurar o perfil alveolar, resultando em melhor sustentação labial. Isto ajuda a evitar o colapso facial e melhora a estética e a função mastigatória (Sánchez *et al.,* 2018).

· Fotografias pré e pós-operatórias: A comparação das fotografias do perfil facial antes e depois da cirurgia pode ajudar a avaliar o sucesso estético do enxerto, especialmente em termos de suporte de tecidos moles (Urban *et al.,* 2012).

3. Relação dentes-lábios e harmonia gengival

O alinhamento adequado dos dentes em relação aos lábios e à gengiva é fundamental para a estética facial. Um enxerto em bloco mal posicionado pode resultar em alteração da linha gengival e afetar negativamente o sorriso do paciente.

Considerações clínicas:

· Análise do corredor oral: O espaço visível entre os lábios ao sorrir, conhecido como corredor bucal, deve estar equilibrado. Um enxerto que restaure corretamente o volume ósseo permitirá a exposição adequada dos dentes, sem expor demais as gengivas ou criar sombras indesejadas no sorriso (Buser *et al.,* 2019).

· Contorno gengival: A restauração óssea no setor anterior deve levar em consideração o contorno gengival. Um enxerto que restaure o volume correto pode melhorar a linha gengival e prevenir um aspecto gengival irregular ou assimétrico (Jensen *et al.,* 2014).

Recuperação funcional

A recuperação funcional é igualmente importante nos procedimentos de enxerto em bloco, pois o objetivo não é apenas melhorar a estética, mas também restaurar a função

mastigatória e fonética do paciente. O setor anterior desempenha um papel fundamental na fonação (produção dos sons da fala) e na capacidade de mastigação, o que sublinha a importância da integração adequada do enxerto ósseo e da posterior colocação de implantes ou próteses.

1. Função de mastigação

O enxerto em bloco fornece uma base sólida para a colocação de implantes dentários, permitindo restaurar a função mastigatória perdida devido à falta de dentes ou à deterioração do suporte ósseo. Um enxerto bem sucedido deve ser capaz de suportar forças mastigatórias sem mobilidade ou reabsorção significativa.

Considerações clínicas:

· Integração do enxerto: A estabilidade primária do enxerto é crucial para a futura colocação do implante. Deve-se garantir que o enxerto esteja bem fixado ao leito receptor por meio de parafusos de titânio, garantindo que ele permaneça estável durante a cicatrização e possa suportar adequadamente as forças mastigatórias após a colocação dos implantes (Misch, 2015).

· Recuperação gradual da mastigação: Os pacientes devem seguir uma dieta leve durante as primeiras semanas (6-8 semanas) de pós-operatório para evitar estresse excessivo no enxerto. Posteriormente, é permitido reintroduzir mais alimentos sólidos à medida que a integração óssea é garantida (Urban *et al.,* 2012).

2. Fonação e suporte labial

O setor anterior da boca é de grande importância na produção dos sons, pois os dentes anteriores desempenham papel fundamental na articulação de determinados fonemas. A perda dentária anterior e a reabsorção óssea associada podem afetar a capacidade do paciente de produzir determinados sons da fala, principalmente aqueles que requerem contato entre a língua e os dentes anteriores, como os sons "s", "t" e "F".

Considerações clínicas:

· Recuperação da fonação: O enxerto em bloco, ao restaurar a anatomia do osso alveolar, fornece uma plataforma adequada para a colocação de implantes ou próteses, permitindo recuperar a correta produção de sons. Além disso, um bom suporte labial ajuda a melhorar a articulação de determinados sons e promove uma fonação mais clara (Sánchez *et al.,* 2018).

· Suporte para próteses ou implantes: A colocação adequada dos implantes sobre o enxerto em bloco garante que as próteses tenham a estabilidade necessária para contribuir tanto para

a função mastigatória quanto para a produção clara da fala (Buser *et al.,* 2019).

3. Estabilidade funcional a longo prazo

A estabilidade funcional do enxerto a longo prazo é fundamental para garantir que o paciente não só recupere a estética e a função oral, mas também mantenha esses resultados ao longo do tempo.

Considerações clínicas:

· Monitoramento pós-operatório: Recomenda-se verificações clínicas e radiográficas periódicas para garantir que o enxerto está bem integrado e que não há sinais de reabsorção ou perda óssea que possam comprometer a função (Jensen *et al.,* 2014).

· Avaliação da carga oclusal: Uma vez colocados os implantes ou próteses, a carga oclusal deve ser avaliada para garantir que as forças mastigatórias sejam distribuídas uniformemente, evitando sobrecargas que possam afetar a estabilidade do enxerto ou implantes (Misch, 2015).

A avaliação da estética facial e a recuperação funcional em enxertos em bloco são aspectos fundamentais que determinam o sucesso do procedimento. A restauração do perfil facial, simetria, proporção e sustentação labial são essenciais para alcançar um resultado estético harmonioso. Ao mesmo tempo, a correta integração do enxerto e a recuperação da função mastigatória e fonética são essenciais para devolver ao paciente uma qualidade de vida plena. Tanto o planejamento pré-operatório quanto o acompanhamento pós-operatório são essenciais para atingir esses objetivos.

4. Manutenção da higiene bucal

A correta regeneração óssea também facilita aManutenção da higiene bucal, um fator chave para funcionalidade a longo prazo. A perda óssea pode criar irregularidades no contorno gengival que dificultam a limpeza adequada, o que por sua vez aumenta o risco de doença periodontal e complicações com implantes dentários.

Considerações clínicas:

· Contorno ósseo e gengival: A restauração do contorno alveolar adequado com enxerto em bloco facilita a higiene oral, permitindo acesso adequado para escovação e limpeza interproximal. Isto é crucial para prevenir a peri-implantite e manter a saúde a longo prazo dos implantes e dos tecidos moles circundantes (Sánchez *et al.,* 2018).

· Monitoramento pós-operatório: É importante orientar o paciente sobre os cuidados com a área enxertada, principalmente nas primeiras semanas, quando o tecido mole está

cicatrizando. O uso de enxaguatórios bucais antissépticos e uma higiene bucal cuidadosa são necessários para evitar infecções que comprometam o enxerto (Jensen *et al.,* 2014).

5. Avaliação pós-operatória e reabilitação

A reabilitação funcionald o paciente não envolve apenas a colocação de implantes ou próteses, mas também o acompanhamento pós-operatório para garantir que o enxerto esteja bem integrado e que não haja complicações que possam comprometer a função a longo prazo.

Considerações clínicas:

· Controles periódicos: Durante o primeiro ano após a cirurgia, é aconselhável realizar verificações periódicas com radiografias e avaliações clínicas para garantir a correta integração do enxerto e a estabilidade dos implantes. Tanto a função mastigatória quanto a fonética devem ser revisadas para ajustar quaisquer problemas que possam surgir (Misch, 2015).

· Reabilitação mastigatória: Uma vez que o enxerto e os implantes estejam totalmente integrados, a reabilitação gradual da articulação pode começar a mastigação, permitindo ao paciente recuperar totalmente a função oral sem risco de danos ao enxerto (Urban *et al.,* 2012).

A recuperação funcional após um enxerto em bloco, inclui a restauração da capacidade de mastigar, falar e manter uma higiene oral adequada, bem como a melhoria do suporte labial e do perfil facial. Os manejos cuidadosos do enxerto, juntamente com o acompanhamento pós-operatório adequado, garantem que o paciente não apenas recupere a função, mas também mantenha esses benefícios a longo prazo.

2.1.11 Avanços tecnológicos e pesquisas futuras abordam enxertos em bloco

A pesquisa em enxertos em bloco avançou significativamente nas últimas décadas, graças à integração de novas tecnologias e materiais que melhoram os resultados estéticos e funcionais. Esses avanços buscam otimizar os procedimentos cirúrgicos, minimizar complicações e melhorar a osteointegração. A seguir, são descritos alguns dos avanços tecnológicos e futuros endereços de pesquisas neste campo.

1. Tecnologia de impressão 3D para enxertos personalizados

A impressão 3D revolucionou o planejamento e execução de procedimentos cirúrgicos na área de regeneração óssea. Esta tecnologia permite a fabricação de enxertos personalizados, especificamente ajustados às características anatômicas do paciente.



Figura 10: Guias cirúrgicos de impressão 3D.

. Impressão de guias cirúrgicos: Guias cirúrgicos personalizados em 3D auxiliam os cirurgiões a posicionar com precisão enxertos e implantes dentários, minimizando erros durante a cirurgia (Mangano *et al.,* 2017).

. Enxertos ósseos personalizados: impressão de enxerto 3D permite criar blocos que se adaptam perfeitamente ao defeito ósseo do paciente, melhorando a estabilidade e integração do enxerto. A utilização de materiais biodegradáveis aliados a fatores de crescimento permite uma melhor regeneração óssea.

2. Biomateriais avançados

O desenvolvimento de biomateriais avançados para enxertos ósseos abriu novas possibilidades para melhorar a osteogênese, a osteindução e a osteocondução. Os biomateriais não atuam apenas como estruturas de suporte, mas também promovem a formação óssea.

. Nanotecnologia aplicada a enxertos: Enxertos melhorados com as nanopartículas podem facilitar a adesão celular e aumentar a capacidade de regeneração óssea. Essas nanopartículas podem liberar fatores de crescimento de forma controlada para promover a osteoindução (Gaharwar *et al.,* 2014).




Figura 11: Nanotecnologia.

· Compósitos biocerâmicos: A combinação de biocerâmicas como fosfato

Demonstrou-se que o cálcio e o vidro bioativo com materiais poliméricos melhoram a regeneração óssea, uma vez que estes materiais são altamente osteocondutores e podem integrar-se com o osso circundante (Jones, 2013).

3. Terapias com células-tronco O uso decélulas-troncona regeneração óssea tem demonstrado grande potencial na melhoria dos resultados clínicos dos enxertos em bloco. As células-tronco mesenquimais têm a capacidade de se diferenciar em osteoblastos, células responsáveis pela formação óssea.



Figura 12: Uso de células-tronco.

· Terapias com células-tronco autólogas: Essas terapias utilizam células-tronco do próprio paciente, o que minimiza o risco de rejeição imunológica e maximiza a capacidade de regeneração óssea. Protocolos estão sendo investigados para combinar células-tronco com enxertos em bloco para melhorar a osteointegração e reduzir o tempo de cicatrização (Liu *et al.,* 2015).

· Engenharia de tecido ósseo: Esta técnica combina estruturas biodegradáveis com células-tronco e fatores de crescimento para criar estruturas que não servem apenas como suporte físico, mas também promovem ativamente a formação óssea.

4. Terapias baseadas em fatores de crescimento

Os fatores de crescimento provaram ser altamente eficazes na promoção da regeneração óssea. Essas proteínas bioativas, como o fator de crescimento transformador Beta (TGF-β) e a proteína morfogenética óssea (BMP), estimulam a diferenciação celular nos osteoblastos.

· Proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs): O uso de BMP-2 em combinação com enxertos em bloco tem mostrado resultados promissores na estimulação da formação óssea em grandes defeitos. A pesquisa atual concentra-se na otimização dos métodos de dosagem e administração para melhorar a eficácia e reduzir os efeitos colaterais (Boyne, 2015).

· Fatores de crescimento vascular: O uso do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) em combinação com enxertos em bloco tem sido investigado para promover a

vascularização precoce e, portanto, melhorar a integração do enxerto e acelerar a formação óssea (Kanczler, Oreffo, 2008).

5. Novas técnicas cirúrgicas e minimamente invasivas

O desenvolvimento de técnicas cirúrgicasminimamente invasivomelhorou significativamente a experiência do paciente e os resultados pós-operatórios.

· Cirurgia guiada por computador: A cirurgia assistida por computador permite o planejamento preciso dos procedimentos cirúrgicos, melhorando a colocação do enxerto e reduzindo o risco de erros. A navegação cirúrgica em tempo real facilita a colocação mais precisa de enxertos em bloco (Sclar, 2014).

· Técnicas de regeneração óssea guiada (GRO): A regeneração óssea guiada através do uso de membranas reabsorvíveis e não reabsorvíveis melhorou a previsibilidade do enxerto em bloco, protegendo a área de regeneração e promovendo a formação óssea (Simion *et al.,* 2019).

Direções de pesquisas futuras

A pesquisa na área de enxertos em bloco continua a evoluir e as áreas de interesse futuro incluem:

· Combinação de terapias celulares e biomateriais: A integração de células- tronco com biomateriais avançados e fatores de crescimento é uma área chave de pesquisa, com o objetivo de criar enxertos bioativos que possam se adaptar e regenerar de forma mais eficaz no paciente.

· Novas fontes de biomateriais: A investigação sobre novas fontes de biomateriais, como a utilização de biomateriais sintéticos e derivados de plantas, está em franca expansão. Esses materiais têm potencial para reduzir custos e melhorar a disponibilidade, além de oferecer propriedades regenerativas superiores (Rath *et al.,* 2016).

· Otimização da dosagem do fator de crescimento: O foco nas terapias baseadas em fatores de crescimento é direcionado à otimização da dosagem e administração para maximizar os benefícios e minimizar os efeitos adversos.

· Estudos de longo prazo sobre estabilidade do enxerto: As pesquisas futuras se concentrarão em estudos longitudinais que avaliem a estabilidade a longo prazo dos enxertos em bloco, bem como o impacto das novas tecnologias na taxa de sucesso dos procedimentos.

Os avanços tecnológicos na regeneração óssea através de enxertos em bloco estão transformando a cirurgia maxilofacial e odontológica. As inovações em biomateriais, impressão 3D, terapias com células estaminais e factores de crescimento estão a melhorar os resultados clínicos, reduzindo complicações e acelerando a cura.

Pesquisas futuras prometem continuar avançando na otimização desses procedimentos, tornando os enxertos em bloco cada vez mais eficazes e previsíveis.

Objetivos

1. Restaurar a função mastigatória e fonética através da regeneração óssea no setor anterior.
2. Melhorar a estética facial e a simetria facial através de enxertos em bloco, garantindo suporte adequado aos implantes dentários.
3. Prevenir e tratar complicações pós-operatórias comuns, como reabsorção óssea e exposição do enxerto, através de cuidados pós-operatórios adequados.
4. Avaliar e otimizar técnicas cirúrgicas aplicando novas tecnologias como impressão 3D e biomateriais avançados.
5. Contribuir para o desenvolvimento de novas terapias e materiais para melhorar a previsibilidade e os resultados a longo prazo dos enxertos em bloco.

2.2 Discussão

A principal vantagem dos enxertos autógenos reside na sua capacidade osteogênica, osteoindutivo e osteocondutor, o que garante melhor integração com o osso receptor. No entanto, a morbidade do local doador e a limitação na quantidade de osso disponível apresenta desafios clínicos. Nesse sentido, enxertos alogênicos e os medicamentos xenogênicos oferecem alternativas menos invasivas, embora com taxas mais elevadas de reabsorção e menor previsibilidade em comparação aos enxertos autógenos.

Uma das principais abordagens da pesquisa atual concentra-se no desenvolvimento de biomateriais sintéticos e terapias com células-tronco para reduzir a dependência de enxertos autógenos, otimizando assim a regeneração óssea e minimizando os efeitos secundário associado Além disso, o uso de tecnologias como a impressão 3D tem maior precisão no planejamento e execução de enxertos em bloco, permitindo personalização adaptada à anatomia específica de cada paciente.

Em termos de rumos futuros, é essencial continuar a avaliar a eficácia dos estes avanços a longo prazo, com estudos clínicos que exploram a estabilidade do enxerto e sobrevivência do implante. Além disso, a combinação de fatores de o crescimento com enxertos bioativos apresenta uma área promissora de pesquisa que Poderia revolucionar os tratamentos de regeneração óssea.

Em resumo, os enxertos em bloco continuam sendo uma solução viável e eficaz para reconstrução do sector anterior, com uma ampla margem de melhoria graças à avanços tecnológicos e terapêuticos que estão surgindo no campo.

3. CONCLUSÃO

A técnica de enxerto em bloco no setor anterior tem se mostrado um método eficaz para regeneração óssea e melhoria da estética facial. Os resultados clínicos indicam que a correta integração do enxerto não só restaura a função mastigatória, mas também contribui significativamente para a recuperação do perfil e simetria facial, melhorando a qualidade de vida do paciente. Além disso, a disponibilidade de diferentes tipos de enxertos (autógenos, alogênicos e xenogênicos) permite a adaptação às necessidades de cada caso, embora os enxertos autógenos continuem sendo o padrão-ouro devido ao seu alto índice de sucesso. É evidente que o planejamento pré-operatório cuidadoso e o manejo pós-operatório adequado são essenciais para minimizar complicações como reabsorção óssea e exposição do enxerto. Os avanços na utilização

de biomateriais avançados, factores de crescimento e tecnologias minimamente invasivas melhoraram os resultados a curto e longo prazo, proporcionando uma abordagem mais previsível e menos invasiva.

REFERÊNCIAS

AGHALOO, T. L., & MOY, P. K. (2007). Which hard tissue augmentation techniques are the most successful in furnishing bony support for implant placement? *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 22*, 49-70.

AL-ANI, Z., NOHL, F., DONALDSON, N., & THOMPSON, G. (2012). The function of anterior teeth and its implications for restorative treatment. *British Dental Journal, 213*(7), 345-350. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2012.872.

ALBANESE, M., RICCI, G., & LUCCHESI, P. (2010). Mandibular bone harvesting for alveolar reconstruction. *Journal of Craniofacial Surgery, 21*(1), 596-602. https://doi.org/10.1097/SCS.0b013e3181cae5c9.

Albrektsson, T., Zarb, G. A., Worthington, P., & Eriksson, R. A. (2012). The long-term efficacy of currently used dental implants: A review and proposed criteria for success. *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 27*(1), 21-29.

ARAÚJO, M. G., LILJENBERG, B., & LINDHE, J. (2010). The influence of a xenograft on the early healing of an extraction socket: An experimental study in the dog. *Clinical Oral Implants Research, 21*(1), 55-64. https://doi.org/10.1111/j.1600-0501.2009.01813.x.

BUSER, D., CHAPPUIS, V., BORNSTEIN, M. M., WITTNEBEN, J. G., FREI, M., & BELSER, U. C. (2013). Long-term stability of contour augmentation with early implant placement following single tooth extraction in the esthetic zone: A prospective, cross-sectional study in 41 patients with a 5- to 9-year follow-up. *Journal of Periodontology, 84*(11), 1517-1527. https://doi.org/10.1902/jop.2013.120617.

BUSER, D., SENNERBY, L., & DE BRUYN, H. (2019). Modern implant dentistry based on osseointegration: 50 years of progress, current trends and open questions. *Periodontology 2000, 81*(1), 7-21. https://doi.org/10.1111/prd.12285.

ESPOSITO, M., GRUSOVIN, M. G., & FELICE, P. (2010). The efficacy of sinus lift procedures: A systematic review. *European Journal of Oral Implantology, 3*(1), 19-29.

FRIEDMAN, J., JAFFE, H., & DOMB, A. (2013). Indications and contraindications for block grafting: a literature review. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 71*(10), 1662-1669.

GARBER, D. A., & SALAMA, M. A. (1996). The aesthetic smile: Diagnosis and treatment. *Periodontology 2000, 11*(1), 18-28.

GILLEN, R. J., SCHWARTZ, R. S., HILTON, T. J., & EVANS, D. B. (1994). An analysis of selected normative tooth proportions. *International Journal of Prosthodontics, 7*(5), 410-417.

GONZALEZ, M. A., ATCHISON, K. A., & KAUFFMAN, T. (2015). Reconstructive dental surgery with block grafting. *Dental Clinics of North America, 59*(1), 169-189.
JENSEN, S. S., BROGGINI, N., & HJORTING-HANSEN, E. (2014). Bone grafts and bone

substitutes. *Clinical Oral Implants Research, 25*(11), 1-15. https://doi.org/10.1111/clr.12180.

JUNG, U. W., SHIN, S. I., & KIM, C. S. (2013). The role of bone grafting in implant dentistry. *Journal of Periodontal & Implant Science, 43*(2), 57-65.

KOKICH, V. O., KIYAK, H. A., & SHAPIRO, P. A. (2006). Comparing the perception of dentists and lay people to altered dental esthetics. *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 18*(3), 145-152.

MARINI, M. G., YOSHIMOTO, M., & MARTINI, M. (2015). Aesthetic and functional rehabilitation of the anterior segment. *Journal of Prosthodontics, 24*(7), 602-609. https://doi.org/10.1111/jopr.12321.

MISCH, C. M. (1997). Comparison of intraoral donor sites for onlay grafting prior to implant placement. *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 12*(6), 767-776.

NKENKE, E., & STELZLE, F. (2009). Clinical outcomes of sinus floor augmentation for implant placement using autogenous bone or bone substitutes: A systematic review. *Clinical Oral Implants Research, 20*(S4), 124-133. https://doi.org/10.1111/j.1600-0501.2009.01776.x.

PITHON, M. M., SANTOS, A. M., CAMPOS, M. S., COUTO, F. S., FERREIRA, J. K., & COQUEIRO, R. S. (2014). Perception of esthetic impact of malocclusion in the social life of university students. *The Angle Orthodontist, 84*(6), 983-988.

URBAN, I. A., LOZADA, J. L., & NAGY, K. (2016). Ridge augmentation with block grafts. *Clinical Advances in Bone Augmentation, 28*(1), 23-34.

URBAN, I. A., MONJE, A., & LOZADA, J. L. (2019). Horizontal ridge augmentation with guided bone regeneration in the anterior maxilla: A systematic review. *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 34*(5), 1076-1084. https://doi.org/10.11607/jomi.7510.

ZUCCHELLI, G., & De SANCTIS, M. (2007). Treatment of multiple recession-type defects in patients with aesthetic demands. *Journal of Periodontology, 78*(10), 1898-1904. https://doi.org/10.1902/jop.2007.070017.